



AIR-FLOW® PLUS

Before using this product, please carefully read and follow the recommendations of the instruction manuals originally delivered with your device and system. Please pay special attention to the safety precautions.

Product Description

The AIR-FLOW® PLUS (prophylaxis powder) is used for subgingival and supragingival treatments.

AIR-FLOW® Master and AIR-FLOW® Master Piezon uses: this powder is neither compatible with the AIR-FLOW® nor with the PERIO-FLOW powder chambers. It has to be used only with the AIR-FLOW® PERIO+PLUS powder chamber.

This powder is for use in dentistry with the EMS air polishing devices.

Applications

This powder removes dental plaque and it is recommended for the following cleaning procedures:

SUBGINGIVAL applications:

- Removal of periodontal biofilm,
- Maintenance in periodontal therapy after completion of initial treatment,
- Implant cleaning.

SUPRAGINGIVAL applications:

- Removal of supragingival biofilm,
- Regular prophylaxis treatments and recalls,
- Removal of colorations around sulcus and in sensitive areas,
- Teeth polishing.

Contra-indications

Patients suffering from upper respiratory tract infections, from chronic bronchitis or asthma must not, under any circumstances, be treated with an air polishing device. The jet of air and powder could cause respiratory difficulties.

Predisposed persons may be sensitive to Chlorhexidin. If allergic reactions are observed, stop using the product and completely remove the powder from mouth.

The treatment of deep periodontal pockets can cause bacteraemia. Please apply restrictions for the treatment of risk patients (endocarditis, pregnancy, breast feeding, contagious disease, immune deficiency (neutropenia, agranulocytosis, diabetes, hemophilia), patients under treatment (radiotherapy, chemotherapy, antibiotics).

Recommendations for the treatment

Patient and user have to wear eye protection.

User has to wear a mask and gloves.

Use the high-speed evacuator of your dental unit.

For the utilization of the PLUS powder with the AIR-FLOW® Master and AIR-FLOW® Master Piezon unit, only use the "AIR-FLOW® PERIO+PLUS" powder chamber.

Le tarte ne peut pas être éliminé par cette poudre.

Appliquer de la Vaseline® sur les lèvres du patient.

Laver le visage du patient après utilisation (ex. avec une lingette).

Apply Vaseline® on the patient's lips before treatment

Wash patient face after use (e.g. with a wet wipes).

General information

- Do not exceed the powder filling limit as indicated on the container.
- Do not stamp down the powder
- This powder is sugar free.

Storage and shelf-life

- The powder should not be stored near heat sources.
- Storage condition up to 25°C and 10% to 90% relative humidity.
- Transport conditions -29°C to 38°C and 10% to 90% relative humidity.
- Do not use after expiration date.
- The powder should not be stored more than one week inside the powder chamber.

Also available:

- AIR-FLOW® CLASSIC available in Lemon, Mint, Cassis, Cherry, Tropical and Neutral (for supragingival treatments).
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (for supragingival treatments).
- AIR-FLOW® SOFT (salt free for supragingival treatments).
- AIR-FLOW® PERIO (salt free for subgingival application).

Powder composition:

- Erythritol
- Amorphous Silica
- Chlorhexidine

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement et respecter les recommandations contenues dans les manuels d'instruction livrés avec l'appareil et le système. Respectez en particulier les remarques concernant la sécurité.

Description du produit

L'AIR-FLOW® PLUS (poudre prophylactique) est employé pour des traitements sous-gingivaux et supra-gingivaux.

Utilisateurs d'appareils AIR-FLOW® Master, AIR-FLOW® Master Piezon: cette poudre n'est pas compatible avec les chambres à poudre AIR-FLOW® et PERIO-FLOW®. Elle peut être utilisée qu'avec une chambre à poudre AIR-FLOW® PERIO+PLUS.

Cette poudre est utilisée en dentisterie avec un appareil aéropolisseur EMS.

Applications

Cette poudre permet l'élimination de la plaque dentaire et est recommandée pour les procédures de nettoyage suivantes:

Applications SOUS-GINGIVALES

- Elimination du biofilm parodontal,
- Entretien dans la thérapie parodontale après le traitement initial,
- Nettoyage d'implants.

Applications SUPRA-GINGIVALES

- Elimination du biofilm parodontal,
- Traitements prophylactiques réguliers et rappels
- Suppression des colorations autour du sillon gingival et dans les zones sensibles,
- Poilissage des dents

Contre-indications

Les patients souffrant d'infections des voies respiratoires supérieures, de bronchite chronique ou d'asthme ne doivent pas, en aucune circonstance, être traités avec un appareil aéropolisseur. Le jet d'air et de poudre pourrait provoquer des difficultés respiratoires.

Des personnes prédisposées peuvent être sensibles à la Chlorhexidine. Si des réactions allergiques se manifestent, cesser l'utilisation et enlever complètement la poudre de la bouche.

Le traitement de poches parodontales profondes peut provoquer une bactériémie. Veuillez tenir compte des restrictions concernant le traitement de patients à risques (endocardite, la grossesse, l'allaitement, maladie contagieuse, un déficit immunitaire (neutropénie, agranulocytose, Diabète, Hémothophilie), patients sous traitement (radiothérapie, la chimiothérapie, les antibiotiques).

Recommandations pour le traitement

Patients et utilisateurs doivent porter des lunettes de protection.

L'utilisateur doit mettre un masque de protection et des gants.

Utiliser la grosse canule d'aspiration de votre unité dentaire.

Pour l'emploi de la poudre PLUS avec les appareils AIR-FLOW® Master, AIR-FLOW® Master Piezon utiliser uniquement la chambre à poudre "AIR-FLOW® PERIO+PLUS".

Le tarte ne peut pas être éliminé par cette poudre.

Appliquer de la Vaseline® sur les lèvres du patient.

Laver le visage du patient après utilisation (ex. avec une lingette).

Apply Vaseline® on the patient's lips before treatment

Wash patient face after use (e.g. with a wet wipes).

Informations générales

- Ne pas remplir le réservoir au-dessus de la limite indiquée,
- Ne pas tasser la poudre,
- Cette poudre est sans sucre.

Entreposage et conservation

- La poudre ne doit pas être stockée à proximité de sources de chaleur.
- Conditions de stockage jusqu'à 25°C et 10% à 90% d'humidité relative.
- Conditions de transport de -29°C jusqu'à 38°C et 10% à 90% d'humidité relative.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- La poudre ne doit pas être stockée plus d'une semaine dans la chambre à poudre

Egalement disponible:

- AIR-FLOW® CLASSIC disponible en Lemon (Citron), Mint (Menthe), Cassis, Cherry (Cerise), Tropical et Neutral (Neutre).
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (pour traitement supra-gingivaux).
- AIR-FLOW® SOFT (sans sel pour traitement supra-gingivaux).
- AIR-FLOW® PERIO (sans sel pour traitements sous-gingivaux).

Composition de la poudre :

- Erythritol
- Silice amorphe
- Chlorhexidine

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie die Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch und folgen Sie den Empfehlungen. Beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise.

Produktbeschreibung

AIR-FLOW® PLUS (Prophylaxepulver) wird für subgingivale und supragingivale Behandlungen verwendet.

Nutzer von AIR-FLOW® Master und AIR-FLOW® Master Piezon: Dieses Pulver eignet sich nicht für die Verwendung in Pulverkammern des Typs AIR-FLOW® oder PERIO-FLOW®. Es ist ausschließlich für eine Verwendung in den neuen Pulverkammern des Typs AIR-FLOW® PERIO+PLUS bestimmt.

Dieses Pulver ist für die Verwendung in der Zahnheilkunde zusammen mit den Airpolishing-Geräten von EMS bestimmt.

Anwendungen

Dieses Pulver entfernt subgingivale Plaque (Belag) und wird für die folgenden Reinigungsverfahren empfohlen:

SUBGINGIVALE Anwendungen:

- Entfernung von periodontalem Biofilm
- Erhaltung in der Parodontaltherapie nach Abschluss der Erstbehandlung
- Implantatreinigung

SUPRAGINGIVALE Anwendungen:

- Entfernung von supragingivalem Biofilm,
- Elimination du biofilm parodontal,
- Traitements prophylactiques réguliers et rappels
- Suppression des colorations autour du sillon gingival et dans les zones sensibles,
- Poilissage des dents

Contraindications

Les patients souffrant d'infections des voies respiratoires supérieures, de bronchite chronique ou d'asthme ne doivent pas, en aucune circonstance, être traités avec un appareil aéropolisseur. Le jet d'air et de poudre pourrait provoquer des difficultés respiratoires.

Des personnes prédisposées peuvent être sensibles à la Chlorhexidine. Si des réactions allergiques se manifestent, interrompre l'usage du produit et retirer complètement le produit de la bouche.

Le traitement de poches parodontales profondes peut provoquer une bactériémie. Veuillez tenir compte des restrictions relatives au traitement de patients à risque (endocardite, grossesse, allaitement, maladies contagieuses, déficience immunitaire (neutropénie, agranulocytose, diabète, hémophilie), patients sous traitement (radiothérapie, chimiothérapie, antibiotiques).

Behandlungsempfehlungen

Patient und Behandler müssen Augenschutz tragen.

Der Behandler muss eine Maske und Handschuhe tragen.

Verwenden Sie die grosse Absaugkanüle Ihrer Dentaleinheit.

Bei einer Verwendung von PLUS Pulver zusammen mit dem AIR-FLOW® Master und AIR-FLOW® Master Piezon darf nur die AIR-FLOW® PERIO+PLUS Pulverkammer genutzt werden.

Zahnstein kann mit diesem Pulver nicht entfernt werden.

Geben Sie Vaseline® auf die Lippen des Patienten.

Reinigen Sie das Gesicht des Patienten nach der Verwendung (z. B. mit einem Feuchttuch).

Applique Vaseline® a los labios del paciente.

Limpia la cara del paciente después del uso (por ejemplo con toallitas húmedas).

Apply Vaseline® on the patient's lips before treatment

Wash patient face after use (e.g. with a wet wipes).

Allgemeine Informationen

Überschreiten Sie nicht die auf dem Behälter angegebene maximale Füllhöhe für das Pulver.

- Drücken Sie das Pulver nicht fest
- Dieses Pulver ist zuckerfrei.

Lagerung und Haltbarkeit

- Das Pulver sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen gelagert werden.
- Lagerung bis 25°C und 10% bis 90% relativer Luftfeuchte.
- Transportbedingungen: -29°C bis +38°C und 10% bis 90% relativer Luftfeuchte.
- Nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
- Das Pulver sollte nicht länger als eine Woche in der Pulverkammer gelagert werden.

Ebenfalls erhältlich:

- AIR-FLOW® Classic erhältlich in Lemon (Zitronen), Mint (Minze), Cassis (schwarze Johannisbeere), Cherry (Kirsche), Tropical (Südfrüchte) und Neutral (für supragingivale Behandlungen)
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (für supragingivale Behandlungen)
- AIR-FLOW® SOFT (salzfrei für supragingivale Behandlungen)
- AIR-FLOW® PERIO (salzfrei für subgingivale Behandlungen)

Pulverzusammensetzung :

- Erythritol
- Amorpher Kieselsäure
- Chlorhexidin

Antes de utilizar este producto, rogamos leer atentamente y seguir las recomendaciones de los manuales de instrucciones suministrados originalmente con el dispositivo y el sistema. Rogamos prestar atención especial a las precauciones de seguridad.

Descripción del producto

El AIR-FLOW® PLUS (polvo profiláctico) se usa exclusivamente para tratamientos subgingivales.

Usuarios de AIR-FLOW® Master y AIR-FLOW® Master Piezon: este polvo no es compatible con las cámaras de polvos AIR-FLOW® y PERIO-FLOW®. Debe utilizarse con las cámaras de polvos AIR-FLOW® PERIO+PLUS.

Este polvo es para utilizarlo en odontología conjuntamente con los dispositivos de pulido neumático EMS.

Aplicaciones

Este polvo elimina la placa subgingival (depósitos) y está recomendado para los siguientes procedimientos de limpieza:

Aplicaciones SUBSINGIVALES:

- Mantenimiento en terapia periodontal después de completar el tratamiento inicial,
- Eliminación de la película biológica periodontal,
- Limpieza de implantes.

Aplicaciones SUPRAGINGIVALES:

- Eliminación de la película biológica supragingival,
- Tratamientos profilácticos periódicos y recordatorios
- Eliminación de coloraciones alrededor del surco gingival y en las zonas sensibles,
- Pulido de los dientes.

Contraindicaciones

Los pacientes que sufren de infecciones de las vías respiratorias superiores, bronquitis crónica o asma no deben ser tratados, bajo ninguna circunstancia, con un dispositivo de pulido neumático. El chorro de aire y polvo puede provocar dificultades respiratorias.

Hay personas predispuestas a ser sensibles a la Clorhexidina. Si se observan reacciones alérgicas, interrumpa el uso del producto y retire completamente el polvo de la boca.

El tratamiento de bolsas periodontales profundas puede causar bacteriemia. Aplique las restricciones pertinentes para el tratamiento de pacientes de riesgo (endocarditis, embarazo, lactancia, enfermedades contagiosas, deficiencia inmune (neutropenia, agranulocitosis, diabetes, hemofilia), pacientes en tratamiento (radioterapia, quimioterapia, antibióticos).

Recomendaciones para el tratamiento

El paciente y el usuario han de llevar protección ocular.

El usuario ha de llevar mascarilla y guantes.

Para la utilización del polvo PLUS con la unidad AIR-FLOW® Master y AIR-FLOW® Master Piezon, debe utilizarse únicamente la cámara de polvos "AIR-FLOW® PERIO+PLUS".

Utilice la aspiración quirúrgica de la unidad dental.

Los cálculos y el sarro no se pueden eliminar con este polvo.

Aplice Vaseline® a los labios del paciente.

Lavare il viso del paziente dopo l'uso (per es. con salviette umidite).

Apply Vaseline® on the patient's lips before treatment

Wash patient face after use (e.g. with a wet wipes).

Información general

- No exceda el límite de llenado de polvo indicado en el recipiente.
- No compactar el polvo.
- Este polvo no contiene azúcar.

Conservación y duración

- No se debe conservar el polvo cerca de fuentes de calor.
- Condiciones de conservación de hasta 25°C a 10% a 90% de humedad relativa.
- Condiciones de transporte: -29°C a +38°C y 10% a 90% de humedad relativa.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- No se debe conservar el polvo más de una semana dentro de la cámara de polvos.

También disponible en:

- AIR-FLOW® CLASSIC disponible en Lemon (Limón), Mint (Menta), Cassis (Grosella negra), Cherry (Cereza), Tropical (Sudfructe) y Neutral (neutro para tratamientos supragingivales).
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (para tratamientos supragingivales).
- AIR-FLOW® SOFT (sin sales para tratamientos supragingivales).
- AIR-FLOW® PERIO (sin sales para aplicaciones subgingivales).

Composición del polvo :

- Eritritol
- Silice amorfa
- Clorhexidina

Prima di usare questo prodotto leggere attentamente e seguire le raccomandazioni contenute nei manuali istruzioni forniti in origine con il vostro dispositivo ed il sistema. Un'attenzione particolare dovrà essere dedicata alle precauzioni per la sicurezza.

Descrizione prodotto

AIR-FLOW® PLUS (polvere per profilassi) si usa per trattamenti Sottogingivali e supragingivali.

Per chi utilizza AIR-FLOW® Master e AIR-FLOW® Master Piezon: questa polvere non è compatibile con le camere a polvere AIR-FLOW® o PERIO-FLOW®. Deve essere usata esclusivamente con la camera a polvere AIR-FLOW® PERIO+PLUS.

Questa polvere si usa presso gli studi dentistici con dispositivi EMS di lucidatura ad aria.

Applicazioni

Questa polvere rimuove la placca sottogingivale (depositi) ed è raccomandata per le seguenti procedure di pulizia:

Applicazioni SOTTOGINGIVALI:

- Rimozione della biopellicola periodontale,
- Manutenzione in terapia periodontale dopo il completamento del trattamento iniziale,
- Pulizia di impianti.

Applicazioni SOPRAGINGIVALI:

- Rimozione della biopellicola sopragingivale,
- Trattamenti e richiami profilattici regolari,
- Rimozione di colorazioni intorno al solo e in aree sensibili,
- Lucidatura dei denti.

Controindicazioni

I pazienti che soffrono da infezioni del tratto respiratorio superiore, di bronchite cronica o di asma non devono in alcun caso essere trattati con un dispositivo di lucidatura ad aria. Il getto d'aria e di polvere potrebbe causare difficoltà respiratorie.

Le persone predisposte possono essere sensibili al Clorhexidina. Se si osservano reazioni allergiche, smettere di utilizzare il prodotto e rimuovere completamente la polvere dalla bocca.

Il trattamento di sacche periodontali profonde può causare batteriemia. Applicare le restrizioni appropriate al trattamento di pazienti a rischio (endocardite, gravidanza, allattamento al seno, malattie contagiose, immunodeficienza (neutropenia, agranulocitosi, diabete, emofilia), pazienti sottoposti a trattamento (radioterapia, chemioterapia, antibiotici).

Raccomandazioni per il trattamento

Il paziente e l'utente devono indossare una protezione oculare.

L'utente deve indossare maschera e guanti.

Utilizzare la cannula di aspirazione ad alta velocità del riunito odontoiatrico.

Per l'utilizzo della polvere PLUS con l'unità AIR-FLOW® Master e AIR-FLOW® Master Piezon, usare esclusivamente la camera a polvere "AIR-FLOW® PERIO+PLUS".

Questa polvere non permette di rimuovere calcoli.

Applicare Vaseline® sulle labbra del paziente prima del trattamento.

Lavare il viso del paziente dopo l'uso (per es. con salviette umidite).

Apply Vaseline® on the patient's lips before treatment

Wash patient face after use (e.g. with a wet wipes).

Informazioni generali

- Non superare il limite di riempimento della polvere come indicato sul contenitore.
- Delta pulver innehåller inget socker.
- Questa polvere non contiene zucchero.

Immagazzinamento e durata

- La polvere non deve essere immagazzinata vicino a fonti di calore.
- Condizioni di immagazzinamento a 25°C dal 10% al 90% di umidità relativa.
- Condizioni per il trasporto: -29°C e +38°C e dal 10% al 90% di umidità relativa.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- La polvere non deve essere immagazzinata dentro la camera a polvere per più di una settimana.

Disponible anche:

- AIR-FLOW® CLASSIC disponible nei gusti Lemon (Limone), Mint (Menta), Cassis (Ribes nero), Cherry (Ciliegia), Tropical (Tropicale) e Neutral (neutro per trattamenti supragingivali).
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (per trattamenti sopragingivali)
- AIR-FLOW® SOFT (senza sale per trattamenti sopragingivali)
- AIR-FLOW® PERIO (senza sale per applicazioni sottogingivali).

Composizione della polvere :

- Eritritolo
- Silice amorfa
- Clorhexidina

Läs noga de bruksanvisningar som medföljer apparaten och systemet och följ rekommendationerna i dessa innan du använder denna produkt. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna.

Produktbeskrivning

AIR-FLOW® PLUS (profylaktiskt pulver) används för subgingivala och supragingivala behandlingar.

AIR-FLOW® Master- och AIR-FLOW® Master Piezon-användare: Detta pulver är kompatibelt varken med AIR-FLOW® eller med PERIO-FLOW® pulverkammare. Det får användas endast tillsammans med den nya AIR-FLOW® PERIO+PLUS pulverkammare.

Detta pulver ska endast användas för tandvård med EMS-luftpolerande apparater.

Tillämpningar

Detta pulver avlägsnar subgingivalt plack (beläggningar) och rekommenderas för följande rengöringsförfaranden:

SUBGINGIVALA appliceringar:

- Avlägsnande av parodontal biofilm.
- Underhåll vid parodontal terapi efter att första behandlingen är slutförd.
- Rengöring av implantat.

SUPRAGINGIVALA appliceringar:

- Avlägsnande av supragingival biofilm.
- Regelbunden profylaktiska behandlingar och underhållsförfaranden.
- Borttagning av missfärgningar runt sulcus och i känsliga områden.
- Tandpolering.

Kontraindikationer

Patienter som lider av övre luftvägsinfektioner, kronisk bronkit eller astma får under inga förhållanden behandlas med en luftpolerande produkt. Luft- och pulverstrålen kan orsaka andningsvägshinder.

Predisponerade personer kan vara överkänsliga mot klrorhexidin. Söta använda produkten och avlägsna pulvret helt från munnen om en allergisk reaktion observeras.

Behandling av djupa tandköttsfickor kan orsaka bakteriem. Vidta särskilda försiktighetsåtgärder vid behandling av riskpatienter (endokardit, graviditet, anning, smittsamt sjukdom, nedsatt immunförsvar (neutropeni, agranulocytos, diabetes, hemofili), patienter under behandling (strålbehandling, kemoterapi, antibiotika).

Rekommendationer för behandling

Patient och användare måste bära ögonskydd.

Använd tandkärnens högsta hastighetssug.

För användning av PLUS-pulvret med AIR-FLOW® Master- och AIR-FLOW® Master Piezon-enheten får endast AIR-FLOW® PERIO+PLUS pulverkammare användas.

Tandsten kan inte avlägsnas med detta pulver.

Applicera Vaseline® på patientens läppar före behandlingen.

Tvätta patientens ansikte efter användning (t.ex. med en våtservett).

Apply Vaseline® on the patient's lips before treatment

Wash patient face after use (e.g. with a wet wipes).

Allmänna upplysningar

- Fyll inte på pulver över den markerig för maximal fyllning som anges på behållaren.
- Detta pulver innehåller inget socker.

Förvaring och hållbarhet

- Pulvret får inte förvaras i närheten av en värmekälla.
- Förvaras upp till 25°C med 10 – 90% relativ luftfuktighet.
- Transportförhållanden: -29°C till +38°C med 10 – 90% relativ luftfuktighet.
- Använd inte efter den sista förbrukningsdagen.
- Pulvret bör inte ligga kvar längre än en vecka inuti pulverkammaren.



AIR-FLOW® PLUS

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte doporučení uvedená v pokynech, které jsou dodávány s originálním přístrojem, a řiďte se jimi. Věnujte prosím pozornost zvláště pokynům týkajícím se bezpečnosti.

Popis produktu
AIR-FLOW® PLUS (profylaktický prášek) se používá výhradně pro subgingivální a supragingivální ošetření.

Užívatelé modelů AIR-FLOW® Master a AIR-FLOW® Master Piezon: tento prášek není kompatibilní s prachovými komorami AIR-FLOW® PERIO+PLUS. Smí se používat pouze s prachovými komorami AIR-FLOW® PERIO+PLUS.

Tento prášek se používá ve stomatologii společně se zařízeními pracujícími na principu aerobraze.

Oblast použití
Tento prášek odstraňuje zubní plak a doporučuje se na následující postupy čištění:

SUBGINGIVÁLNÍ použití:

- Odstraňování periodontálního biofilmu,
- Údržba při periodontální léčbě po dokončení počátečního ošetření,
- Čištění implantátů.

SUPRAGINGIVÁLNÍ použití:

- Odstraňování supragingiválního biofilmu,
- Pravidelné profylaktické čištění a návštěvy,
- Odstraňování skvm kolem sulku a v citlivých oblastech,
- Léštění zubů.

Kontraindikace

- ⚠ Pacienti trpící infekcí horních cest dýchacích chronickou bronchitidou nebo astmatem se za žádných okolností nesmí ošetařovat přístrojem pracujícím na principu aerobraze. Proud vzduchu a prášku může způsobit dýchací potíže.
- ⚠ Osoby s predispozicí mohou být citlivé na chlorhexidin. Pokud zaznamenáte alergické reakce, přestaňte výrobek používat a zola ostraňte prášek z úst.
- ⚠ Léčba hlubokých periodontálních vřáků může způsobit bakteriémií. Při léčbě rizikových pacientů postupujte opatrně (endokarditida, těhotenství, kojení, nakazlivá chřipka, imundeficience (neutropenie, agranulocytóza, diabetes, hemofilie), pacient podstupující léčbu (radioterapie, chemoterapie, antibiotika).

Doporučení pro ošetření

- ⚠ Pacient i uživatel musí být vybaveni ochranou očí.
- ⚠ Osoba provádějící ošetření musí být vybavena maskou a rukavicemi.
- ⚠ Používejte vysokorychlostní odsávací stomatologické soupravy.

Při použití prášku PLUS se zařízením AIR-FLOW® Master a AIR-FLOW® Master Piezon používejte jen prachovou komoru „AIR-FLOW® PERIO+PLUS“.

Tento prášek nedokáže odstranit zubní kámen.

K ochraně rtů pacienta před ošetřením použijte přípravek Vaseline®.

Po použití umyte pacientovy obličej (např. vřhženými ubrousky).

Obsační informace

- Nepřekračujte maximální množství prášku, které je označeno na nádobě.
- Prášek nepěchujte.
- Prášek neobsahuje cukr.
- Uchovávat by neměl by uchovávan v blízkosti zdrojů tepla.
- Skladovací podmínky: do 25 °C, relativní vlhkost 10 % až 90%.
- Podmínky přepravy: -29°C až +38°C, relativní vlhkost 10 % až 90%.
- Po uplynutí doby expirace prášek nepoužívejte.
- Prášek nesmí být uskladněn v zásobníku přístroje déle než týden.

Další násmi:

- AIR-FLOW® CLASSIC s příchutími: citron, mentol, černý rybíz, třešně, tropické ovoce a neutrální příchut (pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® SOFT (neobsahující sůl pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® PERIO (neobsahující sůl pro subgingivální ošetření).
- AIR-FLOW® PERIO (neobsahující sůl pro subgingivální ošetření).

Powder composition :

- Eritritol
- Amorf silis
- Klorhexidin

Složení prášku:

- Erythritol
- Amorfni oxid křemičitý
- Chlorhexidin

Upozorňujeme, že anglický text těchto pokynů je znění, z něhož byly přičleny všechny překlady. V případě jakékoli nesrovnalosti je závazná anglická verze textu.

Obecné informace

- Neprašujte maximální množství prášku, které je označeno na nádobě.
- Prášek nepěchujte.
- Prášek neobsahuje cukr.
- Uchovávat by neměl by uchovávan v blízkosti zdrojů tepla.
- Skladovací podmínky: do 25 °C, relativní vlhkost 10 % až 90%.
- Podmínky přepravy: -29°C až +38°C, relativní vlhkost 10 % až 90%.
- Po uplynutí doby expirace prášek nepoužívejte.
- Prášek nesmí být uskladněn v zásobníku přístroje déle než týden.

Další násmi:

- AIR-FLOW® CLASSIC s příchutími: citron, mentol, černý rybíz, třešně, tropické ovoce a neutrální příchut (pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® SOFT (neobsahující sůl pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® PERIO (neobsahující sůl pro subgingivální ošetření).
- AIR-FLOW® PERIO (neobsahující sůl pro subgingivální ošetření).

Powder composition :

- Eritritol
- Amorf silis
- Klorhexidin

Složení prášku:

- Erythritol
- Amorfni oxid křemičitý
- Chlorhexidin

Bu el kitabının İngilizce versiyonunun ana metin olduğunu ve çevirilere esas plusturduğunu lütfen unutmayın. Herhangi bir farkılık olması durumunda, İngilizce metin bağlayıcı versiyon olacaktır.



A versão inglesa deste manual é a versão original de mesmo. Em caso de discrepância, a versão prevalente é a inglesa.

Napominjemo da je inačica na engleskom jeziku ovog priručnika izvornik iz koga potječu prijevodi. U slučaju bilo kakvog odstupanja, obvezujuća inačica je tekst na engleskom jeziku.

Voor de vertalingen van deze instructies is de Engelse versie als brontekst gebruikt. Bij afwijkingen is de Engelse tekst leidend.

Bemærk, at den engelske udgave af denne vejledning er den originale version, som ligger til grund for oversættelserne. I tilfælde af uoverensstemmelser er den bindende version den engelske tekst.

Vær opmærksom på at den engelske versjonen av denne bruksanvisningen er originalen som oversettelsen er gjort fra. Hvis det skulle forekomme avvik, er det den engelske tekstversjonen som er bindende.

请注意，本手册的译文是根据英文版说明书翻译而来。如有任何分歧，应以英文版为准。

Antes de utilizar este produto, leia atentamente e siga as recomendações dos manuais de instruções que acompanham originalmente o dispositivo e sistema. Preste especial atenção às precauções de segurança.

Descrição do produto
O AIR-FLOW® PLUS (pó profilático) é utilizado para tratamentos subgingivais e supragingivais.

Utilizadores do AIR-FLOW® Master e do AIR-FLOW® Master Piezon: este pó não é compatível com as câmaras de pó do AIR-FLOW® ou do PERIO-FLOW®. Tem de ser utilizado exclusivamente com a nova câmara de pó do AIR-FLOW® PERIO+PLUS.

Este pó destina-se a ser utilizado em estomatologia com os dispositivos de polimento com jacto de ar da EMS.

Aplicações
Este pó remove a placa subgingival (depósitos) e é recomendando para os seguintes procedimentos de limpeza:

Aplicações SUBGINGIVALES:

- Remoção da biopelícula periodontal,
- Manutenção durante a terapia periodontal, após a conclusão do tratamento inicial,
- Limpeza de implantes.

Aplicações SUPRAGINGIVALES:

- Remoção da biopelícula supragengival,
- Tratamento profilático regular e recolhas,
- Remoção de manchas em redor de sulcos e áreas sensíveis,
- Polimento dos dentes.

Contra-indicações

⚠ Os pacientes que sofrem de infecções do trato respiratório superior, bronquite crónica ou asma não podem, em circunstância alguma, ser tratados com um dispositivo polimento com jacto de ar. O jacto de ar e o pó podem provocar dificuldades respiratórias.

⚠ Pessoas com determinada predisposição podem ser sensíveis a clorexidina. Se forem observadas reacções alérgicas, interrompa a utilização do produto e remova completamente o pó da boca.

⚠ O tratamento de bolsas periodontais profundas pode provocar o bacterémia. Aplique as restrições adequadas para o tratamento de pacientes de risco (endocardite, diâbetes, alérgias, doenças contagiosas, imunodeficiência (neutropenia, agranulocitose, diabetes, hemofilia), pacientes sob tratamento (radioterapia, quimioterapia, antibióticos).

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Derin parodontal ceplerin tedavisi bakteriyemiye neden olabilir. Riskli (kalp iç zarı yangısı, hamile olma, enzimze, bulantı hastalığı olma durumları, genel bağışıklık sistemi zayıflığı) (nötropeni, diyâbet, agranulocitoz, hemofili) ve tedavi örnekte olan (radyoterapi, kemoterapi, antibiyotik tedavisi) kimselerin tedavilerine yönelik kısıtlamaları lütfen dikkate alın.

Antes de utilizar este produto, leia atentamente e siga as recomendações dos manuais de instruções que acompanham originalmente o dispositivo e sistema. Preste especial atenção às precauções de segurança.

Descrição do produto
O AIR-FLOW® PLUS (pó profilático) é utilizado para tratamentos subgingivais e supragingivais.

Utilizadores do AIR-FLOW